



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

معاونت بهداشت

گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر

پروتکل دارویی بیماران قلبی عروقی - فشار خون بالا - دیابت - اختلال چربی خون

ادغام برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر منتسب

نام دارو	موارد تجویز
آ.اس.آ (آسپرین ۸۰ میلی گرمی)	<ul style="list-style-type: none"> • برای کلیه افراد با سابقه سکته قلبی • برای کلیه افراد با سابقه ایسکمیک و غیر خونریزی دهنده مغزی • برای کلیه بیماران دیابتی بالای ۵۰ سال دارای حداقل یک عامل خطر بیماری های قلبی عروقی (سابقه خانوادگی بیماری قلبی عروقی زودرس، فشارخون بالا، اختلال چربی خون، مصرف دخانیات و سابقه بیماری کلیوی مزمن با یا بدون میکروآلبومینوری)
ضد انعقاد ها ^(۱)	<ul style="list-style-type: none"> • برای کلیه افراد در معرض خطر متوسط و بالای فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای • برای کلیه مبتلایان به تنگی دریچه میترال و فیبریلاسیون دهلیزی
استاتین ها ^(۲) (داروهای کاهشدهنده چربی خون بالا)	<ul style="list-style-type: none"> • برای کلیه بیماران دیابتی ۴۰ سال و بالاتر • برای کلیه افراد با میزان خطر ۳۰٪ و بالاتر
تیاژیدها ^(۳) (داروهای کاهشدهنده فشار خون بالا)	<ul style="list-style-type: none"> • برای کلیه افراد با میزان خطر ۲۰٪ و بالاتر دارای فشارخون پایدار مساوی یا بیشتر از ۱۴۰/۹۰ میلی متر جیوه • برای کلیه بیماران دیابتی دارای فشارخون مساوی یا بیشتر از ۱۴۰/۹۰ میلی متر جیوه
متفورمین یا سولفونیل اوره	<ul style="list-style-type: none"> • تجویز متفورمین برای کلیه بیماران دیابتی نوع ۲ با قند خون کنترل نشده علیرغم داشتن رژیم غذایی مناسب به شرط نداشتن نارسایی کلیه، بیماری کبد یا هیپوکسی • تجویز سولفونیل اوره در افراد دارای منع مصرف متفورمین^(۴) • تجویز سولفونیل اوره در بیماران با قندخون کنترل نشده، علیرغم مصرف حداکثر دوز متفورمین

(۱) - برخی از ضد انعقادهای رایج عبارتند از : Heparin, warfarin, clopidogrel, bivalirudin, fondaparinux

(۲) - برخی از استاتین های رایج عبارتند از : Atorvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, pitavastatin, simvastatin

(۳) - برخی از تیاژیدهای رایج عبارتند از : داروهای مدر(تیاژیدی) مانند hydrochlorothiazide و یا

calcium channel blockers (CCB), angiotensin receptor blocker(ARB), angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI)

(۴) - برخی از موارد منع مصرف متفورمین عبارتند از : کراتینین بالای ۱/۴، eGFR < ۳۰ شرایط مستعد کننده اسیدوز لاکتیک، بیماران دیابتی با وزن کم