



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آذربایجان غربی

معاونت بهداشت
واحد سلامت نوجوانان و مدارس

آموزش بلوغ براي دختران

دوره اول متوسط





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

معاونت امور بهداشتی

آموزش بلوغ برای دختران متوسطه دوره اول

گردآوری و تدوین: خدیجه حبیبی

زیرنظر: دکتر معصومه حاج شفیعیها

عضویت هیئت عملی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

طرح جلد وصفحه آرایی: حامد مجرد

نوبت چاپ: اول تابستان ۱۳۹۶-

فهرست مطالب

۱	مقدمه
۱	تعريف بلوغ
۲	علت بلوغ
۲	سن شروع بلوغ و عوامل موثر بر آن
۳	عوامل تأثیرگذار در شروع بلوغ
۳	تغییرات فیزیکی (جسمانی)
۷	شکایات اصلی این دوران
۸	توصیه های بهداشتی در دوران قاعدگی
۹	اختلالات پیش از قاعدگی
۹	بلوغ زود رس و بلوغ دیررس
۱۰	بهداشت دهان و دندان در دوران بلوغ
۱۰	نیازهای تغذیه ای دوران بلوغ
۱۴	ورزش
۱۵	تغییرات روحی و عاطفی دوران بلوغ
۱۷	احکام دوران بلوغ


مقدمه

بلغ یکی از باشکوه ترین و در عین حال پیچیده ترین و مسئله سازترین مراحل تکاملی و زندگی انسان است. مرحله ای که در آن شخص از دنیا کودکی، ضعف و خیال خارج شده و پا به دنیای واقعیت ها می گذارد و احساس قدرت و توانایی خاص و بالایی پیدا کرده و احساسهای جدیدی را تجربه میکند. نیرو و توانمندیهای این دوران بیش از هر دوران دیگری است، هم می تواند شخص (و جامعه) را به اوج ترقی و کمال برساند و هم آنها را به قعر ذلت بیافکند.

تعريف بلوغ:

از نظر تعریف به مجموعه تغییرات رشدی جسمانی که شخص را شبیه یک انسان بالغ می کند، بلوغ **puberty** گفته می شود.

دوره ای از روند تکامل است که بعلت تغییرات هورمونی در ساختمان، اندازه و شکل اعضای مختلف بدن دختر تغییراتی ایجاد می شود که نشان می دهد در آینده نزدیک یک زن کامل خواهد شد. این دوره از زندگی را (دوران بلوغ) می گویند.



علت بلوغ:

تقریباً تمامی اعمال و فعالیت های بدن تحت کنترل و تنظیم اجزا یا بافت‌های خاصی موسوم به غده های درون ریز هستند اصلی ترین غده هایی که در بلوغ موثرند عبارتنداز: غده هیپوفیز و هیپو‌تalamوس، غدد فوق کلیوی، تخمدان و غده تیروئید علت بلوغ، تغییر در فعالیت اکثر این غدد است.

از میان غدد بدن غده هیپوفیز نقش مهمتری ایفا می‌کند این غده به عنوان مرکز فرماندهی در رابطه با بلوغ عمل کرده فعالیت سایر غدد را تحت کنترل قرار می‌دهد. غده هیپوفیز هورمون های زیادی ترشح می کند که از بین آنها هورمون رشد و هورمونهای حرک تخمدان با بلوغ ارتباط دارند و اولین تغییر در شروع بلوغ افزایش میزان ترشح این هورمونها است هورمون رشد باعث رشد جسمانی بدن می شود و هورمون های حرک تخمدان باعث افزایش تولید و ترشح هورمونهای متراشحه از تخمدان می شوند.

سن شروع بلوغ و عوامل موثر بر آن:

سن شروع بلوغ تحت تاثیر عوامل متعددی متغیر است ولی به طور طبیعی، بلوغ دختران در محدوده سنی ۹ تا ۱۰ سالگی رخ می دهد و گاهی تا ۱۴ سالگی هم می‌رسد. شروع زودتر و دیرتر آن از زمان های ذکر شده نیاز به بررسی پزشک دارد.

عوامل تاثیرگذار در شروع بلوغ:

- ▶ عوامل ژنتیکی (شروع دوره بلوغ در بستگان مثل مادر، خواهر و....)
- ▶ محل جغرافیایی (منطقه گرمسیر یا سردسیر)
- ▶ وضعیت تغذیه (رزیم غذایی مناسب ، سوء تغذیه)
- ▶ عوامل روانشناسی (تأثیر فرهنگ جامعه، آداب و رسوم ، رسانه ها و.....)
- ▶ نژاد: معمولاً دختران سیاه پوست یک سال زودتر از دختران سفید پوست هم سن و سال خود بالغ می شوند
- ▶ فعالیت بدنی شدید(باعث به تعویق افتادن بلوغ می شود)
- ▶ چاقی متوسط (زودتر بالغ می شوند) چاقی شدید و لاغری(دیرتر بالغ می شوند)

تغییرات فیزیکی (جسمانی) بلوغ در دختران شامل:

۱) رشد سریع قدی و جسمی: در دختران به طور معمول رشد سریع قدر ۱۱ تا ۱۲ سالگی رخ می دهد که تقریباً بطور معمول دو سال پس از جوانه زدن پستان ها و همزمان با وقوع قاعدگی یا (حداکثریک سال قبل از آن) است بطور کلی بلوغ در دختران نزدیک دو سال زودتر از پسران رخ می دهد و به همین

دلیل معمولاً دختران در سنین دوره متوسطه اول بزرگتر از پسران این دوره هستند

برای ایجاد حداکثر تراکم استخوان که شاخص مهمی در مرور دختر ابتلا به پوکی استخوان در او از خر عمر محسوب می‌شود. تجمع توده استخوانی در دوران بلوغ حائز اهمیت است. لذا تغذیه مناسب در این دوران مهم است بخصوص مصرف کلسیم در زنان، تقریباً نیمی از کلسیم تام بدن در دوران بلوغ کسب می‌گردد. عوامل تغذیه‌ای در تنظیم ترشح هورمون رشد نقش دارند. بطوریکه گرسنگی و عده‌های غذایی با پرتوئین بالا سبب ترشح هورمون رشد شده و افزایش قند و چاقی ترشح آن را مهار می‌کند.

(۲) بروز صفات و خصوصیات جنسی ثانویه (زنانه): رشد پستان‌ها به طور متوسط در سن ۹-۱۰ سالگی شروع می‌شود و در اکثر موارد اولین علامت بلوغ می‌باشد که در ابتداء بصورت برآمده شدن مختصر نوک پستان و هاله اطراف آن بوده و به جوانه زدن پستان معروف است که معمولاً در دنای بوده و همزمان در هر دو طرف اتفاق می‌افتد و بتدریج ظرف چهار سال ساختمان و ظاهر پستانها کامل شده و به شکل زنان بالغ درمی‌آیند. استفاده از لباس زیر و سینه بندی‌های مناسب باعث می‌شود که در هنگام فعالیت، بخصوص ورزش و... احساس راحت تری داشته باشید.

نکته: لازم است بدانید که در صورت ترشح از پستان، باید برای مشاوره، معاینه و دریافت خدمات سلامت به پزشک مراجعه کنید.

دومین تغییر در دوران بلوغ، ظاهرشدن موهای شرمگاهی وزیربغل است
مسئول ظاهرشدن موهای شرمگاهی وزیربغل، هورمونهای جنسی ترشح شده
از غدد فوق کلیوی است. بازدموهای زیربغل غدد چربی و عرق هم فعال تو می
شوند و ممکن است بوهای ناخوشایندی ایجاد کنند. می توان باستحمام مرتب
این مشکل راحل نمود. البته گاها این مرحله دراقلیت قابل توجهی از نوجوانان
مقدم بر رشد پستان می باشد.

ممکن است جوش هایی در صورت شما پیدا شود. این جوش ها همانطور که قبل
نیز اشاره شد به دلیل افزایش فعالیت غده های چربی است که دراثر هورمون
ها به وجود می آیند البته این جوش ها که به جوش های غرور جوانی هم
معروف است بارعایت نکات بهداشتی قابل کنترل هستند یادتان باشد که آن ها
رادستکاری نکنید، فشارنده هید یا نکنید. چون در این صورت به احتمال زیاد
عفونی می شوند و بعد از بهبودی جای آنها باقی می مانند. در صورت التهاب شدید
یا چرکی شدن آنها باید به پزشک مراجعه کنید. سستشوی مرتب و کاهش مصرف
چربی و شیرینی در جلوگیری از تشدید آن ها موثر است

**نکته: لازم است توجه داشته باشید که حفظ بهداشت این نواحی و نظافت دوره ای
موهای زاید آن واستحمام مرتب از اهمیت زیادی برای سلامتی شما برخوردار است**

(۳) قاعده‌گی یا پریود: به خونریزی منظم و ماهانه زنانه، قاعده‌گی یا پریود گفته
می شود. شروع قاعده‌گی بطور متوسط در ۱۲-۱۳ سالگی است. ولی بروز اولین
خونریزی قاعده‌گی در فاصله سنی ۹-۱۶ سالگی هم طبیعی است.

قاععدگی عبارت است از خو نریزی فیزیولوژیک دوره ای رحم که معمولاً هر ۴ هفته یک بار اتفاق می افتد. قاععدگی از سن بلوغ شروع و تا زمان یا ئسگی ادامه می یابد.

از شروع قاععدگی تا یک سال ممکن است از نظر دوره های زمانی خونریزی نا منظم و نامرتب باشد. ولی بعد از یک تا دو سال بطور معمول مرتب می شود. در صورت عدم بروز قاععدگی تا ۱۶ سالگی در صورت وجود صفات ثانویه جنسی، عدم بروز صفات ثانویه جنسی تا ۱۴ سالگی حتماً به پزشک مراجعه شود. در صورت بروز قاععدگی نا مرتب و با تاخیر بیشتر از ۳۵ روز ۲ سال بعد از بلوغ حتماً بایستی به پزشک مراجعه شود.

ناراحتیهای زمان قاععدگی ۱ تا ۲ روز قبل از خونریزی شروع و ۴ تا ۵ روز ادامه می یابد. در صورتی که این مشکلات خیلی شدید باشند می توان با مشورت پزشک از مسکن استفاده کرد.


در حالت طبیعی مقدار خونریزی قاععدگی در هر دوره بطور متوسط ۳۵ تا ۶۰ میلی لیتر (کمتر از یک استکان) است. خون قاععدگی معمولاً به آهستگی و بتدریج و بین ۳ تا ۷ روز خارج می شود. بیشترین میزان خونریزی در بین روزهای اول تاسوم قاععدگی بوده و در بقیه روزها کاهش یافته و یا حتی به شکل لکه بینی خواهد بود. در اثر تغییرات هورمونی در بسیاری از دختران، ترشحات دیگری به غیراز خون قاععدگی خارج می شود. این ترشحات معمولاً زرد کم رنگ یا سفید و یا بی رنگ هستند و بدون بو بوده یا بوی کمی دارند. اگر این ترشحات قهوه ای یا سبز شود و یا بوی شدید داشته باشند و یا باعث خارش و سوزش شوند باید به پزشک مراجعه شود.

مشکلات شایع همراه با بلوغ عبارتند از: کم خونی، آکنه، مشکلات روانی و اجتماعی، نزدیک بینی و خونریزی ناشی از اختلال عملکرد رحم.

شکایات اصلی این دوران عبارتند از:

سردرد، عصبانیت، بی حوصلگی، بی خوابی، درد زیر دل و درد ناحیه کمر که اکثر این موارد نیازی به درمان نداشتند و با فعالیت روزانه و رعایت بهداشت و تغذیه مناسب می‌توان آنها را کنترل کرد.

به دنبال تخمک گذاری ماهانه لایه داخلی رحم رشد کرده و در صورت حامله نبودن فرد لایه ریزش کرده به صورت مخلوطی از خون و بافت از رحم جاری شده و از طریق واژن خارج می‌گردد.



توصیه های بهداشتی در دوران قاعده‌گی:

- ❖ رعایت بهداشت فردی واستفاده از وسایل بهداشتی شخصی از جمله حolle و ملحفه و تمیز کردن موهای زائد بدن واستفاده از لباسهای راحت و نخی و همینطور تعویض لباسهای زیر و پدهای (نوارهای) بهداشتی از نکات ضروری است که بایستی رعایت شود.
- ❖ به دلیل دفع خون در دوران قاعده‌گی نیاز به آهن در این دوران افزایش می‌یابد. بنابراین لازم است از مواد حاوی آهن مانند: عدس برگه زردآلو جعفری تخم مرغ و گوشت قرمز بیشتر استفاده شود.
- ❖ راحتی یا داشتن آرامش در این دوران مهم می‌باشد زیرا عصبانیت باعث ترشح موادی در بدن و در نتیجه انقباض و درد بیشتر می‌شود.
- ❖ کم خونی در دختران نوجوان باعث عوارضی مانند ضعف سستی خستگی افسردگی تغییرات خلق و خوی بی حوصلگی طبیعی قلب و در برخی از مواقع تنگی نفس فعالیتی و التهاب زبان و دهان می‌شوند. که هر یک از علائم کافی است تا آنان متهم به تنبلی و گوشه گیری شوند.
- ❖ برای برطرف شدن گرفتگی عضلات و کم شدن درد موارد زیر نیز ممکن است کمک کننده باشد:
 - نوشیدن مایعات گرم (بابونه و چای) در تخفیف گرفتگی عضلات توصیه می‌شود.

- استحمام و گرفتن دوش آب گرم و گذاشتن کیسه آب گرم ویا پارچه ای پشمی دردهای این دوران را کاهش می دهد.
- دراز کشیدن به پشت با زانوهای بالا آمده و چرخاندن دایره ای زانوها
- حرکت به صورت چهار دست و پا (چمباتمه) که در این حالت رحم به پایین آویزان می شود و به شل شدن آن کمک می کند.

اختلالات پیش از قاعده‌ی (PMS):

معمولاً چندروز قبل از شروع قاعده‌ی تغییرات جسمانی نظیر کاهش یا افزایش اشتها، خستگی، بزرگ وحساس شدن پستانها، یبوست، ورم، سردرد، سرگیجه و تغییرات روحی نظیر بد خلقی، افسردگی، خواب آلودگی و بی حوصلگی ظاهری گردد که شدت این علائم در افراد مختلف و متفاوت می باشد و ناشی از تغییرات هورمونی در بدن می باشد و معمولاً خود بخود از بین میرونند. در صورت شدت اختلالات فوق بایستی به پزشک مراجعه کرد.

بلوغ زودرس و بلوغ دیررس چیست:

بلوغ قبل از ۸ سالگی را بلوغ زودرس می گویند. در اغلب موارد علت بلوغ زودرس ناشناخته است. معمولاً رشد پستان ها که از اولین نشانه های بلوغ

است در بیت راز ۹۵/دختران تا ۱۲ سالگی شروع می شود ولی اگر تا ۱۴ سالگی علائم بلوغ در دختری مشاهده نشود به آن بلوغ دیررس می گویند.

به یاد داشته باشیم در صورت بروز علایم بلوغ قبل از ۸ سالگی و یا عدم بروز علایم بلوغ تا سن ۱۴ سالگی حتماً به پزشک مراجعه کنیم

بهداشت دهان و دندان در دوران بلوغ:

در دوران بلوغ، هورمون های اضافی در بدن موجب بروز مشکلاتی در دهان می شوند. لثه ها ممکن است حساس تر و متورم شوند. لذا باید همیشه مساوا ک بزنید و بعد از غذا، با نخ دندان لای دندان هایتان را تمیز کنید.

رعایت بهداشت دهان و دندان باعث جلوگیری از ایجاد بوی بد دهان، بیماری های لثه ای و دیگر مشکلات می شود.


نیازهای تغذیه ای دوران بلوغ:

نیاز به انرژی و مواد مغذی در دوران بلوغ افزایش می یابد که علل آن عبارتند از:

-افزایش سرعت رشد جسمی

-تغییر در عادات غذایی

-ورزش و ازدواج و بارداری که ممکن است در این دوران اتفاق افتد.



افزایی: در دوران بلوغ نیاز نوجوانان به انرژی به علت سوخت و ساز و متابولیسم بالای بدن زیاد می باشد و بهتر است از مواد غذای مناسب از جمله گوشت، لبنیات، سبزیجات و حبوبات تامین شود و از مصرف زیاد قندهای ساده (نوشابه)

های صنعتی، شکلات، آب نبات و سایر مواردی) که صرفاً انرژی زا هستند و ارزش غذایی دیگری ندارند خودداری شود زیرا منجر به افزایش وزن و چاقی در سنین نوجوانی می‌شوند. توصیه می‌شود در برنامه غذایی روزانه نوجوانان مواد نشاسته ای (نان، برنج، ماکارونی و...) به مقدار کافی گنجانده شود. بخش عمدۀ انرژی مورد نیاز نوجوانان از طریق مصرف این مواد باید تامین گردد.

پروتئین: در دوران بلوغ سرعت رشد بدن بیشتر می‌شود و چون بدن برای رشد به پروتئین نیاز دارد نوجوانان باید در برنامه غذایی روزانه خود را متابع پروتئین حیوانی (گوشت، تخم مرغ، شیر و...) و پروتئین گیاهی (حبوبات و غلات) بیشتری استفاده نمایند. برای افزایش ارزش غذایی بهتر است پروتئین‌های حیوانی و گیاهی همراه هم (مثل نان و تخم مرغ، نان و ماست، شیر برنج و...) و یاد نواع پروتئین گیاهی با هم (مثل عدس پلو، لوبیا پلو، عدسی بانان و...) مصرف گردد.

ویتامین‌ها و املاح: در دوران بلوغ بدن نیاز به انواع ویتامین‌ها و املاح معدنی دارد که با مصرف سبزیجات و میوه جات و موادی مثل گوشت و تخم مرغ، حبوبات، مغزها، لبیات و غلات تامین می‌شود. مثل (ویتامین‌های A-D-C و گروه B آهن، کلسیم، روی، ید)

آهن: همانطوری که قبلاً اشاره کردیم نیاز به آهن در دوران بلوغ بیشتر می‌شود بنابراین نوجوانان باید در برنامه غذایی روزانه شان از غذاهای حاوی آهن مانند گوشت، مرغ، ماهی، جگر، حبوبات و سبزیجات برگ سبز استفاده نموده و با مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین C همراه با غذا (مثل مرکبات، گوجه فرنگی

و سبزیهای تازه) به جذب آهن غذا کمک کنند زیرا ویتامین C موجب می شود که آهن غذا بهتر جذب شود.



روی: در دوران بلوغ بدليل افزایش سرعت رشد بدن نیاز به پروتئینها افزایش می یابد و چون برای ساختن پروتئین روی موردنیاز است بنایراین نیاز به روی در دوران بلوغ بیشتر می شود و باید در برنامه غذایی روزانه نوجوانان منابع غذایی حاوی روی یعنی گروه گوشت و حبوبات، تخم مرغ و مغزها گنجانده شود.

باید به یاد داشته باشیم که دوران بلوغ یکی از مهم ترین دوره های زندگی است، چرا که در این دوران جهش رشدی اتفاق می افتد. متأسفانه بسیاری از دختران در سنین بلوغ به رژیم های لاغری شدید و سخت و غیر علمی روی می آورند و خود را مصرف گروه های مختلف غذایی محروم می کنند.

دخترانی که از رژیم های بدون تنوع مواد غذایی استفاده کرده و یا با مصرف خیلی کم مواد غذایی لازم روزانه، سعی در حفظ تناسب اندام خود دارند، از سفره غذایی دارای غذاهای سنتی مغذی و شامل گروه های متعدد غذایی استفاده

نمی نمایند و یا با استفاده مرتب از غذاهای خارج از خانه یافست فودها(که در ظاهر خوشمزه و اشتها برانگیزند ولی فاقد مواد مغذی هستند) باعث صدمه به رشد طبیعی خودشان می شوند.

می دانید که اگر سبزی های تازه یا پخته، شیر و لبنیات و منابع پروتئینی مانند تخم مرغ رابه اندازه مناسب در رژیم غذایی خود نداشته باشید، ممکن است رشد قدری، عضلانی، استخوانی و حتی سیستم دفاعی بدن شما با مشکل مواجه شود؟

باید به یاد داشت که برخی بیماریهای سنین میانسالی مانند آرتروز، فشارخون، بیماری های قلبی عروقی، افزایش چربی خون، دیابت و... ریشه در تغذیه دوران نوجوانی وجوداند. بنابراین توجه به تغذیه در این دوران می تواند در تامین سلامت، چه در این دوره سنی و چه در آینده تاثیرگذار باشد. پس سعی کنیم به جای مصرف فست فودها از غذاهای سنتی و به جای مصرف زیادنوشابه ها از آب، دوغ و شیر استفاده کنیم. همچنین تنقلات سالمی مانند کشمش، نخود، بادام، پسته، گردو، کنجد، ذرت، انجیر خشک و خرماراجایگزین تنقلات بی فایده ای مثل چیپس و پفک کنیم.

ورزش:

یکی از مناسب ترین روش های برای تامین سلامت و نشاط در نوجوانان و جوانان است ورزش علاوه بر تقویح و نشاط و تخلیه انرژی نوجوانان، فواید جسمی و روانی بسیاری دارد. ورزش سبب بهبود عملکرد سیستم های بدن (عضلات، استخوان ها و...) می شود. ورزش سبب تقویت عملکرد قلب، ریه ها، گردش خون و تنظیم

کننده عملکرد سیستم هورمونی بدن می باشد. ورزش فشار عصبی، افسردگی و نگرانی را کاهش می دهد و موجب گستردگی شدن روابط اجتماعی و افزایش ظرفیت شخصیتی نوجوانان و تقویت خودبادی و احساس لیاقت و توانایی آنها می شود.

تغییرات روحی و عاطفی دوران بلوغ: همراه با تغییرات جسمانی در دوران بلوغ یک سلسله دگرگونی ها در احساسات و عواطف، تمایلات و خواسته ها، تصورات و تخیلات نوجوان بوجود می آید و توازن دوران کودکی را بهم می زند و احتمال بروز اختلالات رفتاری را در این دوره افزایش می دهد. انتقال موفقیت آمیز از دوره کودکی به دوره نوجوانی بدون کمک اطرافیان خصوصا والدین موفقیت آمیز نخواهد بود.

بعضی از حالات روحی و اختلالات درسنین نوجوانی بیشتر دیده می شود که اکثرا با توصیه های خاص و مشاوره به راحتی از بین می رونداز جمله این اختلالات افسردگی و اضطراب می باشد:

افسردگی: اختلال بسیار شایع است که از علائم آن بی علاقه کی نسبت به هر چیز و هر کس و گاهی گریه کردن ، عقب افتادن از کارهای روزانه، بهم خوردن نظم خواب یا کم خوابی، داشتن درد بدون علت در بدن و می باشد.

توصیه می شود برای از بین بردن افسردگی:

- به هر طریق ممکن ارتباطات خود را با دوستان و نزدیکان افزایش دهید.
- با استفاده از متون امیدبخش مذهبی به تحکیم اعتقادات خود اقدام کنید.

- به ورزش پردازید و در گروههای ورزشی شرکت کنید.
- بافعالیتها ی هنری خود را سرگرم کنید.
- باوالدین و مریبان خود صحبت و همه افکار و احساسات خود را با آنها در میان بگذارید.
- عمو لا این وضعیت زودگذر است و بزوادی حالت عادی برقرار می شود در صورت بر طرف نشدن مشکل، بایک روانپزشک مشاوره کنید..

اضطراب: اضطراب احساس بسیار ناخوشایند است و اغلب مبهم، بادلو اپسی، دلشوره در بیشتر اوقات بوده و کنترل تشویش برای فرد مشکل می باشد و هر لحظه انتظار واقعه بدی را دارد. از علائم آن طیش قلب، احساس تنگی نفس، بی قراری، شک کردن در مورد انجام کارهی مختلف، خستگی پذیری و زود از کوره در رفت، اشکال دردقت و تمکز حواس و فراموش کردن نکات خیلی ساده و..... می باشد.

توصیه می شود برای ازین بدن اضطراب:

- در مورد حالات مختلف با افراد با تجربه صحبت کنید.
- باورزش کردن به طور مرتب، قوای جسمانی و روانی خود را افزایش دهید
- از مصرف زیاد مواد محرک مثل کاکائو و قهوه خودداری کنید.
- بالنجام فرایض مذهبی و تقویت احساس اتکال به خداوند به آرامش رسیدن خود اقدام کنید.

- اضطراب به مرور مرتفع می گردد و فرد به زندگی عادی ادامه می دهد ولی در صورت تکرار واستمرار توصیه می شود بایک روانشناس یا روانپزشک مشورت کنید.

در چنین مواردی مشورت با افراد صلاحیت دار نظیر معلمان، پدرو مادر، مشاوران، افراد باتجربه و دلسویز شما را قادر به انجام واکنش مناسب می نماید. رشد اخلاقی بارش اجتماعی ارتباط دارد و برای ادامه زندگی سالم و سازنده لازم است صفات اخلاقی مطلوب از جمله اجتناب از کارهای ناپسند و انجام اعمال شایسته مانند بی ریایی، امانت داری، عزت نفس و... را در خود تقویت نمایید.

احکام دوران بلوغ:

اصطلاحا به خونریزی قاعده‌گی حیض نیز گفته می شود و فرد به هنگام دیدن این خون و باشرایط خاص حائض می نامند شرایط خاص عبارتند از:

- ۱- سن او کمتر از ۹ سال و بیشتر از ۵ سال نباشد
- ۲- طول مدت خونریزی کمتر از ۳ روز نباشد
- ۳- خونریزی در ۳ روز اول استمرار داشته باشد
- ۴- فاصله بین دو حیض حداقل ۱۰ روز باشد

برای فرد حائض نماز و روزه واجب نیست نمازهایی که در این ایام خوانده نمی شود قضاندار داما قضای روزه ها را باید بجا آورد وقتی خونریزی قطع شود و مدت قاعده‌گی تمام شد باید برای نماز خواندن و سایر کارهایی که نیاز به طهارت دارند غسل کرد.

غسل رابه دو صورت ترتیبی وارتماسی میتوان انجام داد که در غسل ترتیبی بعدازنیت ابتداء سروگردن سپس طرف راست بدن و در آخر طرف چپ بدن شسته شود و در غسل ارتماسی تمام بدن یکباره در آب قرار می‌گیرد.

برای فرد حائض محرماتی وجود دارد از جمله رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا اسم خدا و پیامبران و امامان علیهم السلام و همچنین خواندن سوره هایی از قرآن که سجده واجب دارند.

توقف در مساجد البته اگر از یک در داخل واز در دیگر خارج شوند معنی ندارد ولیکن رفتن در مسجد الحرام و مسجد النبی حرام می باشد.



امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: دو چیز است که قدر و قیمت شان را نمی شناسند مگر کسی که آن را از دست داده باشد یکی جوانی و دیگری سلامتی

پیغامی از درودهای نمتنگی هر فرد است. در این گاه طی آن

شمازگوکی پر خلی بزرگسالی ولادتی شعبد نهانی که قدرت گو

نوائمندی گویی جیدی را به دست می آوریده